

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLF 23-6-72 411210

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67-084 - STRASBOURG CEDEX

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67-070 - STRASBOURG - CEDEX

Supplément n°2 au Bulletin n°141 du mois de Juin 1972.

20 Juin 1972

CULTURES LEGUMIERES

CHOUX

PUCERON CENDRE DU CHOU

Des colonies de Pucerons cendrés plus ou moins abondantes, sont observées sur choux. Leur présence se manifeste par la décoloration des parties attaquées (jaunissement puis rougissement).

En cas de nécessité, traiter avec l'un des produits figurant sur la liste en votre possession. Le poudrage semble plus adapté pour lutter contre ce ravageur. Si un traitement par pulvérisation est envisagé, avoir soin d'ajouter un mouillant à la bouillie.

L'emploi de l'Oxydéméton méthyl (Méta-Systémox R), le Phosphamidon (Dimécron 10) et le Vamidothion (Kilval, Systamac 400 - Vamifène), est strictement interdit.

POIS

TORDEUSE DU POIS

Les vols de ce micro-lépidoptère ont débuté dans notre élevage depuis quelques jours. Les premières pontes doivent être déposées et les jeunes larves, plus connues sous le nom de "Ver des pois", pourront éclore dans la période du 24 au 27 Juin.

Sur les variétés tardives, effectuer un traitement lorsque celles-ci formeront leurs premières gousses. La floraison des pois étant échelonnée, n'utiliser que des produits reconnus non dangereux pour les abeilles. Seuls, le Diéthion à 1.000 g de M.A./ha et la Phosalone à 600 g de M.A./ha, sont recommandés.

POIREAUX

TEIGNE DU POIREAU

Des vols assez importants ont été enregistrés dans nos élevages dans la semaine du 5 au 10 Juin. Le nombre des captures laisse craindre une attaque assez sérieuse de Teigne sur poireau (Ver du poireau).

Un traitement insecticide pourra être effectué à la fin de la présente semaine.

Utiliser l'un des produits suivants :

- Azinphos : 40 g, Carbaryl : 75 g, Diazinon : 25 g, Lindane : 30 g, Malathion : 75 g, Méthidathion : 40 g, Parathion éthyl : 25 g, Parathion méthyl : 40 g, Phosalone : 60 g (doses exprimées en matière active/hectolitre). Ajouter un mouillant à la bouillie.

Ce traitement sera également efficace pour lutter contre les Thrips qui se manifestent assez abondamment dans les cultures.

TOMATES

MILDIOU DE LA TOMATE

Sur tomates de plein champ, assurer une première protection contre le Mildiou de la tomate, dès réception de la présente note, avec l'un des produits suivants :

.../...

- Mancozèbe : 160 g de M.A./hl, Manèbe : 160 g de M.A./hl, Propinèbe : 210 g de M.A./hl, Captafol : 160 g de M.A./hl.

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

PRUNIER

CARPOCAPSE DES PRUNES

Le relèvement sensible des températures, enregistré depuis le 15 Juin, est à l'origine d'une reprise de l'activité sexuelle des papillons. De nouvelles pontes ont été déposées sur les fruits. Bien que leur nombre reste faible, le pourcentage de fruits porteurs d'une ou de plusieurs pontes, dépasse actuellement le seuil de nuisibilité.

En conséquence, il est conseillé d'exécuter un traitement insecticide dès réception de cette note. Utiliser l'Azinphos à 40 g de M.A./hl ou la Phosalone à 60 g de M.A./hl.

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

POIRIER

PSYLLE DU POIRIER

La présence de Psylles est fréquente sur l'extrémité des rameaux des poiriers. Surveiller leur développement afin d'intervenir en cas de nécessité (choisir l'un des produits figurant sur la liste en votre possession, rubrique Pucerons des arbres fruitiers).

POMMIER

OIDIUM

Cette maladie se développe dangereusement dans certains vergers insuffisamment protégés. Nous invitons les arboriculteurs à être attentifs à ce problème. Dans certains vergers, un traitement spécifique s'impose.

PETITS FRUITS

FRAMBOISIER

DESSECHEMENT DES RAMEAUX (Didymella applanata)

Renouveler la protection dès que possible. Veillez à ce que la pulvérisation pénètre bien dans la masse végétative des jeunes pousses de l'année.

GRANDES CULTURES

POMMES DE TERRE

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Les conditions climatiques restent très favorables aux contaminations par le Mildiou de la pomme de terre (pluies fréquentes, humidité élevée au niveau des plantes).

Bien que les premières taches n'aient pas encore été observées, un deuxième traitement préventif est recommandé. Intervenir avant le 23 Juin.

Ce traitement ne doit pas être négligé.

Pulvériser avec beaucoup de soin, de façon à ce que l'ensemble du feuillage soit protégé.

HOUBLON

PUCERONS

Les migrations de Pucerons ailés se poursuivent. Dans les houblonnières non protégées par le traitement au Diméfox, suivre l'évolution des Pucerons, de façon à pouvoir intervenir si nécessaire.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER.